



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΟ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα : Επιδημολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης
Γραφείο : Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβάστες
Διεύθυνση : Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Πληροφορίες : Ηλεκτρονίδου Δ.
Τηλέφωνα : 210-8899052
Fax Γραμματείας : 210-8818868

**Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την
επιτήρηση της λοιμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 2017**

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της λοιμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για την περιγραφή και κατανόηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της νόσου, αλλά και για τον έγκαιρο προσανατολισμό και την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο (ενισχυμένης επιδημιολογικής επιτήρησης, δράσεων καταπολέμησης κουνόπιων, δράσεων ένημέρωσης, μέτρων για την ασφάλεια του αιματος).

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και φθινοπώρου, το Κ.Ε.Ε.Π.Ν.Ο. ενημερώνεται, σε καθημερινή βάση, για τα τυχόν διαγνωσμένα κρούσματα, από τα έργα στηρίξα στα οποία διαγιγνώσκεται η πλειοψηφία των κραυγμάτων, προβαίνει σε άμεση διερεύνηση αυτών, ενημερώνει τις τοπικές αρχές και εκδίδει ερδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων λοιμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει καθόριστη σημασία, επίσης, για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια του αιματος, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού μέσω μετάγγισης αίματος.

Με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση των κρούσμάτων, συνιστάται να διερευνάτε εργαστηριακά για λοιμωξη από τον Δυτικό Νείλου κάθε κλινικά ύποπτο περιστατικό.

J



Κλινική υποψία λοιμωξης από τον ίδιο τον Δυτικό Νεύλου τίθεται σε κάθε άτομο με πρόσφατη έκθεση σε κουνούπια, ή μετάγγιση αίματος ή μεταμόσχευση οργάνου, ιδίως κατά τους θερινούς - φθινόπωρινούς μήνες ΚΑΙ εμφάνιση τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω:

- i. εγκεφαλίτιδας,
- ii. άσηπτης μηνιγγίτιδας,
- iii. άλλων οξείων κλινικών νευρολογικών έκδηλωσεών από το κεντρικό ή το περιφερικό νευρικό σύστημα (π.χ. οξείας χαλαρής πάραλυσης),
- iv. πυρετού χωρίς κλινικές εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα (που οριομένες φορές συνοδεύεται από εξάνθημα) και απουσία άλλης πιθανότερης διάγνωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εργαστηριακός έλεγχος για τον ίδιο περιστατικών εγκεφαλίτιδας χωρίς καθορισμένη διάγνωση, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.


Για τη διάγνωση της λοιμωξης από τον ίδιο τον Δυτικό Νεύλου στην Ελλάδα, μπορείτε να οτέλνετε δειγματά (αίματος, εγκεφαλονωτιαλού υγρού, ούρων), μαζί με τό «Συνοδευτικό δελτίο αποστολής κλινικού δειγματού», στα παρακάτω εργαστήρια, κατόπιν επικοινωνίας με αυτά και σύμφωνα με τις «Οδηγίες αποστολής δειγμάτος» (www.keelrpo.gr):

- 1) Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμπούων και Αιμορραγικών Πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310 999 006, 2310 999 151),
- 2) Μονάδα Ανόσοολογίας Λοιμώξεων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ: 210 746 2011, 210 746 2133, 210 746 2340).

Επίσης, εργαστηριακός έλεγχος για τον ίδιο μπορεί να διενέργηθει και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Σχετικά με την επιβεβαίωσή της διάγνωσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

- * Η παρουσία υψηλού τίτλου ειδικών αντισώμάτων IgM στο αίμα ή στο ΕΝΥ αποτελούν μεν καλή ένδειξη πρόσφατης λοιμωξης, αλλά μπορεί να οφείλεται σε διάσταυρομένη αντιδραση με όλλους φλαβοϊδούς ή σε μη-ειδική αντιδραση. Επίσης, ένας υψηλός τίτλος αντισώμάτων IgM μπορεί να αφορά σε πολαιότερη λοιμωξη, καθώς τα αντισώματα αυτά μπορεί να παραμείνουν στον ορό για περισσότερο από ένα έτος. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ανήκειντος υψηλού τίτλου ειδικών αντισώμάτων IgM στον ορό, σε ένα μόνο δειγμα, η οξεία λοιμωξη θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με επανέλεγχο του τίτλου των αντισώμάτων στον ορό (2^ο δειγμα) και ανεύρεση αριμαντικής αύξησης του τίτλου τους μεταξύ των διαδοχικών δειγμάτων.



- * Εάν το δείγμα όρου έχει συλλεχθεί εντός 8 ημερών από την έναρξη της νόσου, η απουσία αντισωμάτων IgM δεν αποκλείει τη διάγνωση της λοιμωξης από τον ιδ και επόκλινικής υποψίας θα πρέπει να επαναληφθεί ο έλεγχος σε μετέπειτα δείγμα.

Κάθε εργαστηριακό επιβεβαιωμένο κρούσμα θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., από κλινικούς ή εργαστηριακούς ματρούς, ώστε να διενεργείται έγκαιρα η διερεύνησή του.

Η δική σας εύαισθητοποίηση και συμμετοχή στην πρώιμη διάγνωση των κρουσμάτων θεωρείται καθοριστική σημασίας για την αποτελεσματική και έγκαιρη λήψη στοχευμένων μέτρων πρόληψης:

Στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (www.keeelpno.gr) > 1> Ιός του Δυτικού Νείλου (λοιμωξή απώ) > Πληροφορίες για τους επαγγελματίες μνήσας μπορείτε να βρείτε σχετικό ενημερωτικό υλικό για τη λοιμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου:

1. Ενημέρωση επαγγελματιών μνήσας για τη λοιμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2. Εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης
3. Δελτίο Δήλωσης
4. Οδηγίες απόστολης δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
5. Συνοδευτικό δελτίο απόστολης κλινικού δείγματος προς τα διαγνωστικά εργαστήρια.

Τα Γραφεία Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβίβαστές είναι στη διάθεσή σας για αποιαδήποτε πληροφορία.


Με εκτίμηση,

Η Ιατρός του Γραφείου Νοσημάτων που
Μεταδίδονται με Διαβίβαστές

Δ. Περβανίδης

Η Υπεύθυνή του Τμήματος Επιδημιολογίκης.

Επιτήρησης και Παρέμβασης



Θ. Γεωργακοπόλου

